

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld



AKUTE BORKENKÄFERGEFAHR



Das Land
Steiermark

Borkenkäfer an Fichte



Buchdrucker
4 - 5,5 mm



Kupferstecher
1,8 – 2,6 mm



Das Land
Steiermark



Einfluss des Klimawandels:

Extreme Hitzeperioden – raschere Käferentwicklung

Tagesdurchschnittstemperatur 19 °C - ca. 50 Tage

24 °C - ca. 35 Tage


Aus 200 Buchdruckerweibchen entwickeln sich in einer Vegetationsperiode – wie heuer – bis zu 3 Millionen Käfer.



Der Schaden



- *Anlage der Brut unter der Rinde zerstört das Kambium → der Baum stirbt ab.*
- *Bei frischem Befall findet man das ausgeworfene Bohrmehl in Rindenritzen, Spinnweben und am Stammfuß.*
- *Im Spätstadium löst sich die Rinde ab und die Krone verfärbt sich.*
- *Ausgehend von einzelnen Windwürfen entstehen häufig große Käfernester.*



Aktuelle Fotos



Das Land
Steiermark

Aktuelle Fotos



Das Land
Steiermark

Aktuelle Fotos




Das Land
Steiermark

Aktuelle Fotos



Das Land
Steiermark

Aktuelle Fotos



Das Land
Steiermark



- *Laufende Waldkontrollgänge zur Auffindung der Käfernester*
- *Schlägerung aller befallenen Bäume und sofortiger Abtransport zum Sägewerk oder bekämpfungstechnische Behandlung vor Ort (Entrinden, Häckseln etc.)*
- *Verstärkte Kontrolle der Befallsflächen im nächsten Frühjahr*
- *Saubere Waldwirtschaft (Waldhygiene)*





- *Begründung von Mischbeständen – höhere Resistenz gegen Waldschäden – geringeres Betriebsrisiko*
- *Erhöhung der Vitalität durch Waldpflege (Durchforstung, Mischwuchsregelung)*

